

BEWUSSTLOSIGKEIT – ERKENNEN – GEFAHREN – MAßNAHMEN

Die Bewusstlosigkeit ist der Verlust des Bewusstseins, der Handlungsfähigkeit und der willkürlichen Reaktionen durch unterschiedliche Ursachen. Viele Erkrankungen, Unfälle oder Vergiftungen können zu einer lebensbedrohlichen Bewusstlosigkeit führen

Ursachen: (jede Veränderung im Körper kann zur Bewusstlosigkeit führen)

- ↻ stumpfe o. spitze Gewalteinwirkung auf den Kopf
- ↻ Sauerstoffmangel, Epilepsie, Schlaganfall
- ↻ Herzinfarkt, allergische Reaktionen
- ↻ niedriger Blutdruck, Stromunfall

Die Ursache ist oft nicht feststellbar!

Erkennen einer Bewusstlosigkeit :

- ↻ nicht ansprechbar
- ↻ nicht erweckbar
- ↻ keine Reaktion auf Schmerzreiz



Gefahren einer Bewusstlosigkeit :

- ↻ Einatmen von Fremdkörpern z.B.: Blut, Erbrochenes
- ↻ Atemstillstand
- ↻ Kreislaufstillstand
- ↻ Zusatzverletzungen

Maßnahmen bei einer Bewusstlosigkeit :

Wenn man die Bewusstlosigkeit erkannt hat, und sichergestellt hat, dass die Atmung noch vorhanden ist, muss man die betroffene Person schnellstmöglich in die stabile Seitenlage bringen. Säuglingen und Kleinkinder in Bauchlage bringen. Der Sinn der stabilen Seitenlage liegt darin, dass der Mund der tiefste Punkt des Kopfes wird, so dass die Zunge nach vorne fällt und Erbrochenes abfließen kann.

- ↻ Stabile Seitenlage
- ↻ Notarzt rufen – 112 wählen
- ↻ Wärmeerhaltung

Die stabile Seitenlage wird nur durchgeführt, wenn die Atmung noch vorhanden ist. Eine Seitenlage bei Atemstillstand oder Herz - Kreislaufstillstand ist wirkungslos.